


# Если Вас укусили летающие кровососущие насекомые – КОМАР?



**КОМАР** – ЭТО КРОВОСОСУЩЕЕ НАСЕКОМОЕ. ДЛИНА ТЕЛА ОТ 4 ДО 14 ММ, КРЫЛЬЯ В РАЗМАХЕ ДО 3 СМ. ОКРАСКА МОЖЕТ БЫТЬ САМОЙ РАЗНОЙ. СКОРОСТЬ КОМАРА ДОСТИГАЕТ 3,2 КМ/Ч. ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ, КОМАРЫ ПРОЛЕТАЮТ ДО 100 КМ. ВЕС ЕГО НАСТОЛЬКО МАЛ, ЧТО ПОПАВ В ПАУТИНУ, КОМАР НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОЛЕБАНИЙ И НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ПАУКА. "КРОВОПИЙЦЫ" ТОЛЬКО САМКИ – КРОВЬ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОТОМСТВА. ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ – ПЕРЕНОСЧИКИ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: МАЛЯРИЯ, ЛИХОРАДКИ, ЭНЦЕФАЛИТЫ, ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ТУЛЯРЕМИЯ. ОПАСНОСТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ: УКУСОВ КОМАРА ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАМЕЧАЕТ; ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ МОГУТ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ; ПО ЛЕЧЕНИЮ АНТИБИОТИКИ БЕСПОЛЕЗНЫ.



- 1) ПРИ ПОЕЗКЕ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ТРОПИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ;
- 2) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: РЕПЕЛЕНТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ПОЛОГИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ПАВЛОВСКОГО, ФУМИГАТОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ);
- 3) РЕПЕЛЕНТЫ: дэта, дмф, ir3535. АЭРОЗОЛИ, КРЕМЫ, ГЕЛИ, МОЛОЧКО, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА. НАНОСЯТ НА КОЖУ ИЛИ ОДЕЖДУ;
- 4) ИНСЕТИЦИДЫ: АЛЬФА-АЛЛЕТРИН, ТРАНСФЛУТРИН, ПРАЛЛЕТРИН. ЭТО ЖИДКОСТЬ, АЭРОЗОЛЬ. ПРИМЕНЯЮТ ТОЛЬКО НА ОДЕЖДУ;
- 5) СЕТКИ ПАВЛОВСКОГО, ПРОПИТАННЫЕ ОТПУГИВАЮЩИМ СОСТАВОМ, ДЕЙСТВУЮТ ДО 2 МЕСЯЦЕВ.



## ЕСЛИ УКУСИЛ КОМАР:

- 1) ПРИ ЗУДЕ: ПРИМЕНЯТЬ НАРУЖНО ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДИМЕТИНДЕН (ФЕНИСТИЛ ГЕЛЬ, ТРИДЕРМ, "СПАСАТЕЛЬ");
- 2) МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ: БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА, БРИЛЛИАНТОВУЮ ЗЕЛЕНЬ, СОК ЛИМОНА, ЛИСТ МЯТЫ, ПОДОРОЖНИКА, АЛОЭ, КАЛЕНДУЛЫ, ЧАЙНЫЙ ПАКЕТИК ЗАВАРКИ, КУСОЧЕК ЛЬДА;
- 3) ПИЩЕВАЯ СОДА: ВАТНЫЙ ДИСК СМОЧИТЬ В КИПЯЧЁНОЙ ВОДЕ, ПРИЛОЖИТЬ К СОДЕ, ПОТОМ К МЕСТУ УКУСА 1 МИНУТУ ДО 3 РАЗ В ДЕНЬ;
- 4) ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ПОЯВЛЕНИИ ОТЁКА ЛИЦА, БОЛИ, ЗАТРУДНЕНИИ ДЫХАНИЯ – ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ.

# Если Вас укусили летающие кровососущие насекомые – МОШКА?



МОШКА

**МОШКИ** – НАСЕКОМЫЕ ОТРЯДА ДВУКРЫЛЫХ. ДЛИНА ТЕЛА МОШЕК ОТ 1,2 ДО 6 ММ. ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА ОНИ ИЗДАЮТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК ЗА СЧЁТ РАЗВИТЫХ ЖУЖЖАЛЕЦ. МОШКИ ОБИТАЮТ НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ, КРОМЕ АНТАРКТИДЫ И ПУСТЫНИ САХАРА. НАЛИЧИЕ ВОДЫ – УСЛОВИЕ ОБИТАНИЯ МОШЕК. САМКИ МОШЕК ПРЕДПОЧИТАЮТ ПИТЬ КРОВЬ. САМЦЫ – ПИТАЮТСЯ НЕКТАРОМ РАСТЕНИЙ. УКУСЫ МОШЕК СОПРОВОЖДАЮТСЯ БОЛЬЮ, ОТЁЧНОСТЬЮ, ЗУДОМ, ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА. УКУС МОШЕК ОПАСЕН ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ – В СЛЮНЕ СОДЕРЖАТСЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ ЯДЫ. ПЕРЕНОСЯТ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОНХОЦЕРКОЗ, МИКСОМАТОЗ, СИБИРСКАЯ ЯЗВА, ТУЛЯРЕМИЯ, ЧУМА И ПРОЧИЕ.



МОШКА:  
ЗАЩИТА



МОШКА:  
УКУСИЛА

- 1) НЕ РАСПОЛАГАЙТЕСЬ НА ОТДЫХ ВБЛИЗИ ВОДОЁМОВ С БЕРЕГАМИ, ПОРОСШИМИ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ;
- 2) НАДЕВАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРИКРЫВАЮЩУЮ ТЕЛО ОДЕЖДУ;
- 3) НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПИКНИК РЯДОМ СО СКОТОВОДЧЕСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ;
- 4) ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕПЕЛЕНТЫ В ВИДЕ СПРЕЕВ, МАЗЕЙ, ЛОСЬОНОВ; ИХ НАДО НАНОСИТЬ НА ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА;
- 5) ПРИМЕНЯТЬ ФУМИГАТОРЫ ПО ИНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ТОКСИЧНЫЕ ДЛЯ МОШЕК ВЕЩЕСТВА;
- 6) МОЖНО НАНЕСТИ НА КОЖУ ЭФИРНОЕ МАСЛО С ЗВОЗДИКОЙ ИЛИ ЭВКАЛИПТОМ.

## ЕСЛИ УКУСИЛА МОШКА:

- 1) ПРОМЫТЬ РАНКУ ВОДОЙ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МЫЛОМ;
- 2) ОБРАБОТАТЬ МЕСТО УКУСА ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА И ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ЙОДОМ ИЛИ ЗЕЛЁНКОЙ;
- 3) ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОТЁЧНОСТИ ПРИЛОЖИТЬ МАРЛЕВЫЙ ИЛИ ВАТНЫЙ ТАМПОН, СМОЧИВ ЕГО РАСТВОРОМ ПИЩЕВОЙ СОДЫ ИЛИ БОРНЫМ СПИРТОМ;
- 4) ВЫПИСТЬ АНТИГИСТАМИННОЕ СРЕДСТВО;
- 5) ЕСЛИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОД РУКОЙ НЕТ, ТО МОЖНО НАНЕСТИ НА УКУСУС КАШИЦУ ИЗ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА, РЕПЧАТОГО ЛУКА ИЛИ ПОЛЫНИ.

# Если Вас укусили летающие жалящие насекомые – ПЧЕЛА?



ПЧЕЛА

ПЧЕЛА – ЛЕТАЮЩЕЕ ЖАЛЯЩЕЕ НАСЕКОМОЕ. ОКРАСКА ПЧЕЛЫ ИЗ ЧЁРНОГО ФОНА С ЖЁЛТЫМИ ПЯТНАМИ. РАЗМЕР ПЧЕЛЫ ОТ 3 ММ ДО 45 ММ. Известно около 21 тысячи видов пчёл. Пчёлы не встречаются там, где нет цветущих растений. Продукты жизнедеятельности пчёл широко используют в медицине: яд, прополис, воск, мёд и пыльцу. Пчёлы кусают 1 раз в жизни – оставляют жало и умирают. Единичные укусы не приносят проблем, кроме боли, зуда и покраснения. Если у человека индивидуальная непереносимость к пчелиному яду, нужно срочно обратиться к врачу. Пчелиный яд вызывает сильный отёк, аллергическую реакцию, укусы нескольких пчёл вызывают интоксикацию.



ПЧЕЛА:  
ЗАЩИТА

- 1) ВЫЕЗЖАЯ ЗА ГОРОД, ЯРКОЕ, С КОРОТКИМ РУКАВОМ НЕ НОСИТЬ!
- 2) НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ ГИГИЕНЫ СО СТОЙКИМ ЗАПАХОМ.
- 3) НЕ ПОДХОДИТЬ К УЛЬЯМ, ОСИНЫМ ГНЁЗДАМ, ДЫРАМ В ПНЯХ.
- 4) НА ПИКНИКЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ОТКРЫТИМИ ПИЩУ, ФРУКТЫ, СОКИ.
- 5) МУСОР, ОСТАТКИ ЕДЫ УПАКОВЫВАТЬ В ПАКЕТЫ, МУСОРНЫЙ БАК НА ДАЧЕ ЗАКРЫВАТЬ КРЫШКОЙ.
- 6) НЕ УБИВАТЬ ПЧЁЛ! ПОГИБАЯ, ОНИ ВЫДЕЛЯЮТ ФЕРОМОН ТРЕВОГИ, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ СИГНАЛОМ К АТАКЕ.
- 7) ЕСЛИ ПЧЕЛА РЯДОМ, НЕ РАЗМАХИВАТЬ РУКАМИ. НОСИМ ГОЛОВНОЙ УБОР: ПЧЁЛ ЗЛЯТ ЗАПАХ ПОТА, АЛКОГОЛЯ, РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ.



ПЧЕЛА:  
УКУСИЛА

## ЕСЛИ УКУСИЛА ПЧЕЛА:

- 1) ПОСЛЕ УКУСА ИЗВЛЕКАЮТ ЖАЛО! МЕСТО УКУСА ОБРАБОТАТЬ СПИРТОМ, ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА, РАСТВОРОМ МАРГАНЦОВКИ;
- 2) СДЕЛАТЬ ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС;
- 3) ВЫПИТЬ ВОДЫ ИЛИ ЧАЮ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА ЖИДКОСТИ;
- 4) У ЧЕЛОВЕКА С АЛЛЕРГИЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАСПОРТ С КОТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОПИСАНИЕМ СИМПТОМОВ, СПОСОБАМИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. АЛЛЕРГИКИ НОСЯТ ПРИ СЕБЕ ШПРИЦ И НАБОР МЕДИКАМЕНТОВ;
- 5) 25-30 КАПЕЛЬ КОРДИАМИНА; ДАТЬ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: КЛАРИТИН, ТАВЕГИЛ, ДИМЕДРОЛ, СУПРАСТИН; ОБЛОЖИТЬ ГРЕЛКАМИ;
- 6) ВЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ.